

Souhlas s léčebným postupem / výkonem ARTROSKOPIE RAMENNÍHO KLOUBU


Jméno a příjmení pacienta: _____

Rodné číslo: _____

Bydliště: _____

Rameno: pravé levé

Účel: diagnostický terapeutický



Vážená paní / Vážený pane,

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byl lékařem navržen operační zákrok, jehož cílem je diagnostika a případně odstranění příčiny bolestivosti a omezené hybnosti ramenního kloubu. Tyto obtíže jsou obvykle způsobeny poškozením měkkých tkání kloubu, šlach, svalů či kloubní chrupavky.

Účel a povaha léčebného postupu / výkonu:

Účelem tohoto zákroku je stanovení diagnózy a rozsahu poškození ramenního kloubu (diagnostický účel) nebo řešení již diagnostikovaných obtíží (terapeutický účel).

Artroskopie ramenního kloubu je miniinvazivní endoskopický operační výkon umožňující vizualizaci a případně i ošetření dutiny ramenního kloubu a okolních struktur (šlach, kloubní chrupavky, pouzdra, vazů a dalších nitrokloubních struktur). Tato technika obvykle vede k menší pooperační bolesti, menším jizvám a rychlejšímu zotavení ve srovnání s tradiční otevřenou operací.

Průběh léčebného postupu / výkonu:

Zákrok bude proveden v celkové anestezii nebo svodné anestezii operované končetiny; k anestezii bude podepsán samostatný informovaný souhlas.

Operace začíná zavedením kamery skrze drobný řez na přední straně ramena. Dalšími 1-2 malými řezy (1-2 cm) se zavádějí do ramenního kloubu nástroje k diagnostice poškození kloubu a k ošetření nálezu na nitrokloubních strukturách (vazy, šlacha, chrupavky a stěny kloubu). Po ošetření nálezu následuje výplach ramenního kloubu. Na konci operace se kožní vstupy uzavřou stehy a zakryjí se sterilním krytím. Operovaná končetina je fixována v ortéze.

V případě většího poškození šlach rotátorové manžety, které nelze ošetřit artroskopicky, může být nutné rozšíření operačního výkonu otevřenou technikou. Prostřednictvím většího kožního řezu (6-8 cm dlouhého) vedeného na přední nebo zevní straně ramenního kloubu se v takovém případě provede sešití odtržených svalů případně jiný nezbytný zákrok. Po takové operaci se mohou vyskytovat jizvy a přechodné hematomy na operované končetině a v jejím okolí.

Předpokládaný přínos léčebného postupu / výkonu:

Očekávaným přínosem v případě diagnostického účelu výkonu je stanovení či upřesnění diagnózy a následně možnost zahájení vhodné léčby v závislosti na nálezu.

Očekávaným přínosem v případě terapeutického účelu výkonu je odstranění příčiny obtíží, snížení či odstranění bolesti a zlepšení hybnosti kloubu.

Jiné (alternativní) možnosti řešení současného zdravotního stavu mimo navrhovaný léčebný postup včetně výhod a nevýhod:

Alternativní možností v případě terapeutického účelu operace je konzervativní léčba pomocí léků a fyzioterapie. Výhodou je nezatížení pacienta operačním výkonem s uvedenými riziky, nevýhodou pak přetrvávající postižení ramenního kloubu, které může vést k dalšímu poškození měkkých struktur a chrupavky, se vznikem předčasných degenerativních změn.

Alternativou může být otevřená operace. Ta se využívá pro složitější případy poškození ramenního kloubu a jeho okolí. Otevřený zákrok obvykle vyžaduje delší celkovou anestezii, nese vyšší riziko pooperačních komplikací a delší dobu rekonvalescence.

Možná rizika, důsledky a komplikující stavy léčebného postupu / výkonu:

Žádný zákrok v oblasti péče o zdraví není bez rizik. I přes správně poskytnutou, náležitou a důslednou péči zdravotnických pracovníků, kteří se na poskytování zdravotních služeb podílejí, může během výkonu nebo po něm dojít ke komplikacím, a to i takovým, které zde nejsou výslovně uvedeny. Tyto situace mohou vyžadovat dodatečnou zdravotní péči a ve výjimečných případech mohou i ohrožovat život pacienta.

Běžné následky výkonu:

- Bolest v místě operace, která obvykle odezní během několika týdnů.
- Otok, který může přetrvávat až několik měsíců.
- Komplikace spojené s celkovou anestézií jako nauzea, zvracení a podobně jsou vypsány v samostatném souhlasu k anestezii.

Rizika:

- Infekce rány, tvorba hematomu.
- Alergické reakce na použitý materiál či léky.
- Omezení hybnosti kloubu, vznik srůstů a pooperační ztuhlosti.
- Poškození nervů nebo cév v oblasti operace (vzácně, může vést k dočasnému či trvalému oslabení nebo změně citlivosti operované končetiny).
- Selhání rekonstrukce šlachy (pokud byla provedena), vyžadující případnou revizní operaci.
- Změna tvaru, osy či délky operované končetiny.
- Komplikace související s implantací cizorodého materiálu (např. kotev při rekonstrukci šlach či vazů) – možnost mechanického selhání kotvy, jejího uvolnění nebo migrace, reakce okolních tkání, případně vzácně alergická či zánětlivá reakce na materiál implantátu.

Následný léčebný režim, omezení v obvyklém způsobu života a pracovní schopnosti:

Po zákroku může být pracovní schopnost dočasně omezena v závislosti na rozsahu zákroku, individuálním průběhu hojení a povaze a náročnosti vykonávané práce, obvyklá doba pracovní neschopnosti je 2-6 týdnů.

V prvních 5-7 dnech po operaci je doporučeno omezit pohyb na minimum a dbát na klidový režim, aby nedošlo k narušení hojení rány. Lehké aktivity jsou povoleny. Celková rekonvalescence je individuální v závislosti na věku a kondici pacienta a typu artroskopického výkonu. Obvykle se pohybuje mezi 6-12 týdny. Po dobu minimálně 3-6 týdnů je někdy nutné používat ortézu ramenního kloubu. Po sejmutí ortézy je doporučena rehabilitace dle pokynů lékaře.

Sprchování je možné od 4. dne po operaci, nicméně je třeba po osprchování rány dezinfikovat a čistě krýt. Koupání vč. vany, bazénu atp. se nedoporučuje po dobu 2 až 3 týdnů po zákroku, aby se předešlo riziku infekce. Stehy se obvykle odstraňují po 10-14 dnech, pokud nejsou vstřebatelné; o konkrétním termínu odstranění stehů Vás bude informovat lékař či koordinátor.

Péče o jizvy zahrnuje pravidelné kontrolování operačních ran a jejich šetrné čištění. Po zhojení je vhodné jizvu jemně masírovat, aby se předešlo tvorbě ztuhlých jizev. Rány je nutné po výkonu sledovat a ihned kontaktovat lékaře, pokud by došlo ke vzniku otoku, zarudnutí, horečky, zvýšené bolesti nebo výtoky z ran, což může být známkou infekce nebo jiných komplikací.

Prohlášení lékaře:

Prohlašuji, že jsem pacienta informoval o jeho aktuálním zdravotním stavu a jeho předpokládaném vývoji, vysvětlil jsem mu podstatu léčebného postupu / výkonu včetně možných důsledků a výše uvedených rizik. Rovněž jsem ho seznámil s důsledky odmítnutí navrhovaného postupu. Všechny výše uvedené body jsem pacientovi vysvětlil způsobem, který byl pro něj podle mého názoru srozumitelný.

V Liberci dne: _____

Jméno a podpis lékaře: _____

Informace pro pacienta:

Prosím, přečtěte si pozorně všechny strany tohoto dokumentu. Pokud jste zcela neporozuměl/a lékařovu vysvětlení, nebo potřebujete-li další informace, neváhejte se prosím lékaře zeptat.

Zájmem lékaře je Vám pomoci. Lékař Vám vysvětlí podstatu léčebného postupu / výkonu a seznámí Vás s možnými alternativami. Můžete mu položit doplňující otázky. Máte právo navržený léčebný postup / výkon odmítnout. Máte právo na druhý názor.

Jestliže s textem prohlášení souhlasíte, prosím podepište jej.

Prohlášení pacienta:

Prohlašuji, že jsem byl/a lékařem v klidu a dostatečném časovém prostoru, srozumitelně informován/a o aktuálním zdravotním stavu a jeho předpokládaném vývoji, byl/a jsem seznámen/a s podstatou léčebného postupu / výkonu, včetně možných důsledků a výše uvedených rizik, a rovněž o jeho alternativách. Na základě tohoto poučení prohlašuji, že souhlasím s uvedeným léčebným postupem / výkonem, i s tím, že může být proveden jakýkoliv další výkon, pokud by jeho neprovedení bezprostředně ohrozilo můj zdravotní stav nebo život.

Informacím jsem plně porozuměl/a. Má znalost jazyka, ve kterém je prohlášení psáno, je na takové úrovni, že jsem vše pochopil/a. Byla mi dána možnost klást doplňující dotazy, které mi byly řádně a dostatečně zodpovězeny.

Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení svobodně a výslovně souhlasím s výše uvedeným postupem / výkonem.

Prohlašuji, že jsem nezamlčel/a žádné známé údaje o svém zdravotním stavu, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu.

Po přečtení poučení mám tyto připomínky, požadavky, námítky:

V Liberci dne: _____

Podpis pacienta: _____


(případně jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce)

Verifikační protokol pro potvrzení operované/vyšetřované strany

Jméno a příjmení pacienta: _____

Rodné číslo: _____

Na obrázku označte operované místo



	Strana: zaškrtněte X – ano		datum	podpis (+ jmenovka zdravotníka)
	pravá	levá		
Pacient/ka				
Lékař v ambulanci				
Sestra při příjmu				
Lékař při příjmu				
Anesteziolog				